

### شکستگی دندان: علل، پیشگیری و درمان جامع

شکستگی دندان یکی از مشکلات شایع در حوزه سلامت دهان و دندان است که به دلایل مختلفی مانند دندان قروچه، نیروهای نامتعادل فک، ترمیم‌های وسیع و حتی عادات نادرست غذایی رخ می‌دهد. در این مقاله، با استناد به صحبت‌های دکتر صفی آبادی، به بررسی عمیق‌تر عوامل ایجاد شکستگی، روش‌های پیشگیری و درمان‌های نوین می‌پردازیم. همراه ما باشید تا با جزئیات کامل، راهکارهای محافظت از دندان‌ها را بیاموزید.



### عوامل اصلی شکستگی دندان

نیروهای شدید ناشی از جویدن (اکلوژن) مانند اکلوژن زودرس یا نامتعادل، فشار مضاعفی به دندان‌ها وارد می‌کنند. این فشار در افرادی با مشکلات ارتودنسی بیشتر است، زیرا نیرو به‌صورت نابرابر روی دندان‌ها توزیع می‌شود و نقاط ضعیف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دندان قروچه (براکسیسم) نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، با سایش مداوم مینا و عاج، ساختار دندان را ضعیف کرده و خطر ترک یا شکستگی را افزایش می‌دهد. جالب است بدانید استرس‌های روانی مانند اضطراب امتحانات یا فشارهای کاری، تأثیر مستقیمی در تشدید دندان قروچه دارند.

### تأثیر ترمیم‌های وسیع بر شکستگی دندان

پرکردگی‌های بزرگ، به ویژه با استفاده از آمالگام، بخش قابل توجهی از ساختار طبیعی دندان را حذف می‌کنند. این موضوع دندان را مستعد شکستگی می‌کند، چرا که مواد سنتی مانند آمالگام فاقد خاصیت چسبندگی به دیواره‌های دندان هستند. در مقابل، کامپوزیت‌های باندشونده با ایجاد اتصال قوی به بافت دندان، استحکام ساختاری را بهبود بخشیده و ریسک شکستگی را کاهش می‌دهند. امروزه، استفاده از مواد همرنگ دندان نه تنها زیبایی را حفظ می‌کند، بلکه دوام درمان را نیز افزایش می‌دهد.



### درمان ریشه و افزایش شکنندگی دندان

دندان‌های درمان ریشه‌شده (عصب‌کشی‌شده) به دلیل از دست دادن رطوبت و عصب، خشک و شکننده می‌شوند. این دندان‌ها بدون محافظت مناسب (مانند روکش)، در معرض فشارهای جویدن مستعد شکستگی عمودی ریشه (VRF) هستند. با علائمی مانند درد موضعی، التهاب لثه و الگوی J شکل در رادیوگرافی شناسایی می‌شود. متأسفانه، در موارد پیشرفته، کشیدن دندان تنها راه حل ممکن است. برای پیشگیری، توصیه می‌شود بلافاصله پس از درمان ریشه، از روکش‌های مقاوم مانند زیرکونیا استفاده شود.

### علائم شکستگی عمودی ریشه دندان (VRF)

شکستگی عمودی ریشه اغلب با درد مداوم، تورم لثه و حساسیت به دما همراه است. دندانپزشکان با ابزارهایی مانند پروب پرپودنتال، افزایش غیرعادی عمق پروبینگ در نواحی خاص را بررسی می‌کنند. در تصاویر رادیوگرافی، الگوی J شکل یا هاله‌ای تاریک دور ریشه، نشانه‌ای قطعی از شکستگی است. این عارضه معمولاً در دندان‌های درمان ریشه‌شده رخ می‌دهد، زیرا خشک شدن ساختار، انعطاف‌پذیری دندان را از بین می‌برد و ریسک شکستگی را افزایش می‌دهد.

الگو های تجزیه استخوان



D شکستگی عمودی ریشه

E نرمال

### کشیدن یا نگهداری دندان شکسته؟

در مواردی که شکستگی محدود به ناحیه کرونا (تاج) یا سطح ریشه باشد، درمان محافظه کارانه مانند ترمیم با کامپوزیت یا روکش سرامیکی یا اینله/آنله پیشنهاد می شود. در مواردی که ترک به ریشه رسیده یا التهاب لثه شدید است، کشیدن دندان و جایگزینی آن با ایمپلنت یا بریج منطقی تر است. با این حال، پیش آگهی این دندان ها معمولاً ضعیف است و احتمال نیاز به کشیدن در بلندمدت وجود دارد. تصمیم نهایی به عواملی مانند عمق ترک، وضعیت پالپ (زنده یا غیرزنده)، سلامت لثه و همکاری بیمار در رعایت بهداشت دهان بستگی دارد.

### مواد مناسب برای ترمیم دندان های ترک خورده

- کامپوزیت های باندشونده: این مواد برای ترک های کوچک و سطحی ایده آل هستند. آنها با پرکردن فضای ترک و چسبیدن به دیواره های دندان، استحکام ساختاری را به دندان بازمی گردانند.
- روکش های تمام سرامیکی: روکش های زیرکونیا و ایمکس به دلیل مقاومت بالا و زیبایی طبیعی، برای دندان های ضعیف شده پس از درمان ریشه توصیه می شوند.
- فایبر پست: در دندان های اندو نشده، این روش با تقویت ساختار داخلی دندان و کانال ریشه، از شکستگی مجدد جلوگیری می کند.

### اقدامات اورژانسی برای ترک های دندانی

در مواجهه با ترک دندان، اولین قدم کاهش فشار جویدن (فشار اکلوژنی) روی ناحیه آسیب دیده است. دندانپزشکان با روش هایی مانند تنظیم اکلوژن یا استفاده از مواد تثبیت کننده موقت مانند رزین یا سیلانت، دندان را تثبیت کرده و درد را کاهش می دهند. سپس با تست های حرارتی (سرما و گرما)، سلامت پالپ بررسی می شود. اگر پالپ ملتهب یا نکروز شده باشد، بیمار به متخصص اندودنتیست ارجاع داده می شود. در موارد خفیف، ترمیم نهایی با کامپوزیت های باند شونده انجام می گیرد.

### تفاوت تست گرما و سرما در تشخیص مشکلات دندانی

- حساسیت به گرما: درد طولانی پس از تماس با گرما (مثلاً نوشیدن چای داغ)، نشانه التهاب پالپ است و معمولاً نیاز به درمان ریشه دارد.

- حساسیت به سرما: این واکنش ممکن است ناشی از حساسیت عاج دندان یا ترک‌های سطحی باشد و لزوماً به معنای آسیب پالپ نیست. این مشکل، اغلب با ترمیم ساده یا استفاده از خمیردندان ضدحساسیت بهبود می‌یابد. تشخیص دقیق این دو مورد، نیازمند معاینه تخصصی و گاه استفاده از لیزر دیاگنوستیک است.

#### نایت گارد: محافظتی ضد استرس برای دندان‌ها

نایت گاردهای سفارشی ساخته‌شده توسط دندانپزشک، با توزیع یکنواخت نیروی جویدن، از سایش و فشار ناشی از دندان‌قروچه (براکسیسم) جلوگیری می‌کنند. این ابزارها به‌ویژه برای افراد تحت استرس‌های روانی (مانند دانشجویان یا کارمندان پر استرس) ضروری هستند. استفاده از نایت گاردهای آماده به دلیل عدم تطابق با آناتومی دهان، می‌تواند باعث آسیب لثه یا تشدید مشکلات فکی شود. توصیه می‌شود نایت گارد حتماً زیر نظر دندانپزشک و مختص بیمار طراحی و ساخته شود.



#### آینده تشخیص ترک‌های دندانی با فناوری‌های پیشرفته

ابزارهای نوینی مانند توموگرافی نوری (OCT) و لیزر فلورسانس، امکان شناسایی ترک‌های ریز و عمقی را فراهم می‌کنند. هوش مصنوعی نیز با تحلیل تصاویر رادیوگرافی، دقت تشخیص را افزایش می‌دهد. این فناوری‌ها با شناسایی زودهنگام ترک‌ها، از پیشرفت آسیب به پالپ و نیاز به درمان‌های پیچیده جلوگیری می‌کنند.

- توموگرافی نوری (OCT): این فناوری با استفاده از امواج نوری، تصاویر سه بعدی با وضوح بالا از ساختار دندان ایجاد می کند و ترک های میکروسکوپی را شناسایی می نماید.
- لیزر فلورسانس: با تابش لیزر به دندان، مناطق ضعیف یا ترک خورده به صورت نقاط درخشان نشان داده می شوند.
- هوش مصنوعی (AI): الگوریتم های هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر رادیوگرافی، الگوهای شکستگی را با دقت ۹۵٪ تشخیص می دهند.

### جمع بندی

شکستگی دندان نیازمند توجه فوری و انتخاب روش درمانی مناسب است. مراجعه منظم به دندانپزشک، استفاده از نایت گارد در صورت دندان قروچه (براکسیسم) و بهره گیری از مواد ترمیمی مدرن، بهترین راهکارهای پیشگیری هستند. در صورت تجربه علائمی مانند درد طولانی یا حساسیت به دما، مراجعه به متخصص را به تأخیر نیندازید. فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و لیزر، آینده دندانپزشکی را متحول کرده و درمان را سریع تر و کم تهاجمی تر نموده اند.

### سوالات متداول

۱. آیا شکستگی دندان در کودکان شایع است؟  
خیر. شکستگی دندان بیشتر در بزرگسالان به دلیل عواملی مانند دندان قروچه، ترمیم های وسیع یا ضربه های ناگهانی رخ می دهد. با این حال، کودکان نیز در صورت زمین خوردن یا بازی های پرخطر ممکن است دچار انواعی از شکستگی دندان شوند.
۲. آیا نوشیدنی های اسیدی مانند آب لیمو می توانند باعث شکستگی دندان شوند؟  
بله. مصرف مداوم نوشیدنی های اسیدی مینای دندان را ضعیف می کند و آن را مستعد ترک یا شکستگی می نماید. بهتر است پس از مصرف این مواد، دهان با آب شسته شود.
۳. آیا ورزش هایی مانند بوکس خطر شکستگی دندان را افزایش می دهند؟  
بله. ورزش های پر برخورد مانند بوکس، هاکی یا راگبی بدون استفاده از محافظ دهان (مثل مادگارد)، خطر شکستگی دندان را به طور چشمگیری افزایش می دهند.
۴. چگونه می توان درد دندان شکسته را در خانه موقتاً تسکین داد؟

استفاده از کمپرس سرد روی صورت، مصرف مسکن‌های بدون نسخه (مثل ایبوپروفن) و پرهیز از جویدن با طرف آسیب‌دیده، می‌تواند درد را تا مراجعه به دندانپزشک کاهش دهد.

۵. آیا بیمه درمانی هزینه ترمیم دندان شکسته را پوشش می‌دهد؟

پوشش بیمه بسته به نوع قرارداد متفاوت است. معمولاً درمان‌های ضروری مانند کشیدن یا ترمیم ساده تحت پوشش قرار می‌گیرند، اما روکش‌های لوکس یا ایمپلنت ممکن است شامل نشوند. قبل از استفاده از این موارد، حتماً با شرکت بیمه‌گر خود مشورت کنید.